

# 1 апреля

**«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ» –  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО. В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОН ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ  
ИЗВЕСТНЫМ ИЗ «ПТИЧЬИХ» ПРАЗДНИКОВ, И  
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЭМБЛЕМОЙ:**







Информация  
о зимующих  
птицах  
в словах и  
картинках





**Дятел** - птица, достаточно крупный и один из наиболее известных представителей семейства дятловых. Как правило, ведёт оседлый образ жизни и лишь на северной периферии ареала в неблагоприятные в кормовом отношении годы совершает массовые кочёвки-инвазии в соседние регионы.

Дятел играет важную роль в экологии леса, оставляя выдолбленные им дупла для других гнездящихся в них мелких птиц, таких как синиц и мухоловок. Кроме того, он в большом количестве поедает лесных вредителей — тлю, гусениц бабочек и питающихся древесиной насекомых.

Длина 22—27 см, размах крыльев 42—47 см, масса 60—100 г. В окрасе преобладание чёрных и белых тонов, которые в сочетании с ярко-красным (у отдельных подвигов — розовым) подхвостьем и придают птице пёстрый вид. Верх головы, спина и надхвостье чёрные с синеватым блеском. Лоб, щёки, плечи и брюхо буровато-белые; последнее в зависимости от района обитания может быть светлее либо темнее, варьируя от чисто белого до буроватого или почти шоколадного. Выбор кормов самый разнообразный, в зависимости от сезона с уклоном в сторону животной или растительной пищи.





**Синица** — самый крупный и наиболее многочисленный из всех встречающихся в России видов синицевых птиц. Обитает в Европе, Азии и Северо-Западной Африке. В дикой природе встречается в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам водоёмов. За небольшим исключением, размножается с конца января по сентябрь, делая две кладки за сезон. Гнездится в дуплах и пустотах деревьев, а также в разнообразных нишах как природного, так и антропогенного происхождения. Длина 13—17 см, масса 14—21 г, размах крыльев 22—26 см.[2] Имеет довольно яркое оперение, среди других птиц выделяясь прежде всего ярко-жёлтым брюшком с «галстуком» — широкой чёрной полосой от груди до гузки. Верх головы, или шапочка, чёрный с синим металлическим блеском. Щёки белые. На затылке желтовато-белое пятно. Тяготеет к жилью человека, часто встречается в крупных городах и других населённых пунктах, в пригородах, в садах и парках. Питается преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Уничтожая большое количество вредителей леса, приносит несомненную пользу природе. Зимой сбивается в смешанные стайки с другими птицами и кочует в поисках корма. Охотно посещает кормушки, где кормится семечками подсолнуха.





**Снегирь** (*Pyrrhula pyrrhula*), птица семейства вьюрковых отряда воробьиных. Длина тела около 18 см, весит около 35 г. Верх головы и хвост чёрные, спина серая; брюшко у самок и молодых буроватое, у самцов — красное. Снегири населяют всю Европу, Переднюю Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно осёдлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги. Питается снегирь преимущественно семенами, почками, некоторыми паукообразными и ягодами. Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть





**Чи́ж** — птица семейства вьюрковых отряда воробьиных. Длина тела около 12 см, весит 12—14 г. Оперение желтовато-зелёное с тёмными пестринами. Распространён в Евразии; в СССР в зоне хвойных лесов, в лесах Крыма, Кавказа и борах Казахстана. Зимой кочует стайками, особенно по долинам рек с зарослями лиственных деревьев. Гнездится обычно на елях или соснах. В кладке 4—5 яиц. Насиживает самка 12 суток. Иногда Ч. гнездится дважды в лето. Питается семенами хвойных и лиственных деревьев, в частности ольхи, поедает тлей и других мелких насекомых. Ч. часто содержат в клетках. Весит она 11—14 г. Самец зеленоватый, с желтой грудкой и черной шапочкой, самка серовато-бурая с пестринами. Клюв у чижа конический, как у зерноядных птиц, короткий. Гнезда чижи всегда устраивают на елях, высоко от земли и искусно прячут в густых ветвях, так что снизу обнаружить их невозможно. Постройку гнезда производит одна самка, но самец часто приносит материал.

